



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE

Número de autorización: 21649

Fecha de inscripción: 18/06/1997

Fecha de caducidad: 31/01/2018

Titular

ISAGRO S.P.A.

Via Caldera ,21

CENTRO UFFICI SAN

SIRO, FABBRICATO D -

ala 3 -

20153 Milán

(Milan)

ITALIA

Fabricante

ISAGRO S.P.A.

Via Caldera ,21 CENTRO UFFICI

SAN SIRO, FABBRICATO D - ala 3 -

20153 Milán

(Milan)

ITALIA

Tipo
Fungicida

Función:

Composición: SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

Envases:

Presentación/Capacidad/Material

Caja de cartón de 1 Kg. con bolsa interior de polietileno conteniendo 20 paquetes y sacos de polietileno de 10 y 25 Kg.

Usos y dosis autorizados:

| USO | AGENTE | Dosis % | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|----------|-------------|-----------|--|
| Ajos | ALTERNARIA | 0,6 - 0,9 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Almendro | ABOLLADURA | 0,6 - 1 | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | CRIBADO | | |
| | MONILIA | | |
| | MOTEADO | | |



Nº REGISTRO: 21649
BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE

| USO | AGENTE | Dosis % | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-------------------------------------|------------------|------------|---|
| Avellano | BACTERIOSIS | 0,6 - 1 | |
| | MONILIA | | |
| Berenjena | ALTERNARIA | 0,6 - 1 | P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 600 l/Ha. y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico por campaña. |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Brécol | ALTERNARIA | 0,6 - 1 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Cebolla | ALTERNARIA | 0,6 - 0,9 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Chalote | ALTERNARIA | 0,6 - 0,9 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Cítricos | AGUADO | 0,2 | Pulverizar hasta una altura de 1,5 metros. |
| | BACTERIOSIS | | |
| | FOMOPSIS | | |
| | HONGOS ENDOFITOS | | |
| Coliflor | ALTERNARIA | 0,6 - 1 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Cucurbitáceas de piel comestible | ALTERNARIA | 0,6 - 0,75 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | ALTERNARIA | 0,6 - 0,75 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Frutales de hueso | ABOLLADURA | 0,6 - 1 | Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1200 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña. |
| | BACTERIOSIS | | |
| | CRIBADO | | |
| | MONILIA | | |
| | MOTEADO | | |
| Frutales de pepita | BACTERIOSIS | 0,6 - 1 | Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1200 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña. |
| | MONILIA | | |
| | MOTEADO | | |
| Garbanzo | RABIA | 0,6 - 1 | |
| Granado | BACTERIOSIS | 0,6 - 1 | |
| | CRIBADO | | |
| | MONILIA | | |



| USO | AGENTE | Dosis % | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|----------------------|------------------|---------|--|
| | MOTEADO | | |
| Guisantes verdes | ALTERNARIA | 0,6 - 1 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Habas verdes | ALTERNARIA | 0,6 - 1 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Higuera | BACTERIOSIS | 0,6 - 1 | |
| | MONILIA | | |
| | MOTEADO | | |
| Hortícolas de hoja | ALTERNARIA | 0,6 - 1 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Judías verdes | ALTERNARIA | 0,6 - 1 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Lúpulo | MILDIU | 0,6 - 1 | |
| Nogal | BACTERIOSIS | 0,6 - 1 | |
| | MONILIA | | |
| Olivo | REPILO | 0,6 - 1 | |
| | TUBERCULOSIS | | |
| Ornamentales leñosas | MANCHAS FOLIARES | 0,6 - 1 | |
| | ROYAS | | |
| Patata | MILDIU | 0,6 - 1 | |
| Pistacho | ALTERNARIA | 0,6 - 1 | |
| | BACTERIOSIS | | |
| Tallos jóvenes | ALTERNARIA | 0,6 - 1 | |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Tomate | ALTERNARIA | 0,6 - 1 | P.S.: 3 días en tomate de invernadero. efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 600 l/Ha. y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico por campaña. |
| | ANTRACNOSIS | | |
| | BACTERIOSIS | | |
| | MILDIU | | |
| Vid | BACTERIOSIS | 0,6 - 1 | |
| | MILDIU | | |

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

| Uso | P.S. (días) |
|---|-------------|
| Berenjena, Tomate | 10 |
| Almendro, Avellano, Brécol, Cítricos, Coliflor, Garbanzo, Granada, Higuera, Hortícolas de hoja, Lúpulo, Nogal, Olivo, Patata, Pistacho, Vid | 15 |



| Uso | P.S. (días) |
|---|-------------|
| Ajos, Cebolla, Chalote, Cucurbitáceas de piel comestible, Guisantes verdes, Habas verdes, Judías verdes, Tallos jóvenes | 3 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | 7 |
| Frutales de hueso, Frutales de pepita, Ornamentales leñosas | NP |

Condiciones generales de uso:

Aplicar en pulverización normal.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías o húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.

Excepciones:

Excepto espárrago.

Clase de usuario:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación: --

Clasificaciones y Etiquetado:

| | |
|---|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Nocivo Peligroso para el medio ambiente |
| Pictograma | N Xn |
| Palabra Advertencia | |
| Indicaciones de peligro | R20 - Nocivo por inhalación R50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático |
| Consejos de Prudencia | S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S22 - No respirar los polvos S25 - Evítese el contacto con los ojos S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta |
| Clase y categoría de peligro (Medio ambiental) | |
| Pictograma | |



| | |
|--------------------------------|--|
| Palabra Advertencia | |
| Indicaciones de peligro | |
| Consejos Prudencia | |

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales: --

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y tóxicos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/02, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Otras indicaciones reglamentarias:

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --