



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: BIOTEN

Número de autorización: 25234

Fecha de inscripción: 22/04/2009

Fecha de caducidad: 22/04/2019

Titular

ISAGRO ESPAÑA S.L.

Diego de León, 58 Esc. B 1º Izq.
28006 MADRID
(Madrid)

Fabricante

ISAGRO ESPAÑA S.L.

Diego de León, 58 Esc. B 1º Izq.
28006 MADRID
(Madrid)

Composición: TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA ICC012) 2% (5 X 10 E7 UFC/G) +
TRICHODERMA GAMSII (CEPA ICC080) 2% (5 X 10 E7 UFC/G) [WP] P/P

Tipo Función: Fungicida

Envases:

Presentación/Capacidad/Material

Bolsa de poliéster-aluminio-polietileno de 0,5, 1, y 5 kg.

**Usos y dosis autorizados:**

USO	AGENTE	Dosis (ver nota)	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Especifico)
Berenjena	FITOPHTORA		En semillero: Aplicar en mezcla con el sustrato a dosis de 0,25 kg/m ³ de sustrato. En terreno de asiento, efectuar 2 aplicaciones, la 1ª, en pulverización al suelo 7-10 días antes de la siembra o plantación y la 2ª inmediatamente después de la siembra o transplante a razón de 2,5 Kg/Ha. y aplicación.
Calabacín	FITOPHTORA		En semillero: Aplicar en mezcla con el sustrato a dosis de 0,25 kg/m ³ de sustrato. En terreno de asiento, efectuar 2 aplicaciones, la 1ª, en pulverización al suelo 7-10 días antes de la siembra o plantación y la 2ª inmediatamente después de la siembra o transplante a razón de 2,5 Kg/Ha. y aplicación.
Fresales	FITOPHTORA		En semillero: Aplicar en mezcla con el sustrato a dosis de 0,25 kg/m ³ de sustrato. En terreno de asiento, efectuar 2 aplicaciones, la 1ª, en pulverización al suelo 7-10 días antes de la siembra o plantación y la 2ª inmediatamente después de la siembra o transplante a razón de 2,5 Kg/Ha. y aplicación.
Lechuga	ESCLEROTINIA		En semillero: Aplicar en mezcla con el sustrato a dosis de 0,25 kg/m ³ de sustrato. En terreno de asiento, efectuar 2 aplicaciones, la 1ª, en pulverización al suelo 7-10 días antes de la siembra o plantación y la 2ª inmediatamente después de la siembra o transplante a razón de 2,5 Kg/Ha. y aplicación.
Melón	FITOPHTORA		En semillero: Aplicar en mezcla con el sustrato a dosis de 0,25 kg/m ³ de sustrato. En terreno de asiento, efectuar 2 aplicaciones, la 1ª, en pulverización al suelo 7-10 días antes de la siembra o plantación y la 2ª inmediatamente después de la siembra o transplante a razón de 2,5 Kg/Ha. y aplicación.



USO	AGENTE	Dosis (ver nota)	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Olivo	VERTICILIUM		En vivero: Aplicar al 1-2% en mezcla con el sustrato (1 a 2 g. cada 100 g. o ml. de sustrato). En suelo definitivo, aplicar al transplante a razón del 1-2% en mezcla con el sustrato o en pulverización a la raíz con 10-20 g/plantón. En años sucesivos aplicar en el agua de riego a razón de 2,5-5 Kg/Ha.
Pimiento	FITOPHTORA		En semillero: Aplicar en mezcla con el sustrato a dosis de 0,25 kg/m ³ de sustrato. En terreno de asiento, efectuar 2 aplicaciones, la 1ª, en pulverización al suelo 7-10 días antes de la siembra o plantación y la 2ª inmediatamente después de la siembra o transplante a razón de 2,5 Kg/Ha. y aplicación.
Tomate	FITOPHTORA		En semillero: Aplicar en mezcla con el sustrato a dosis de 0,25 kg/m ³ de sustrato. En terreno de asiento, efectuar 2 aplicaciones, la 1ª, en pulverización al suelo 7-10 días antes de la siembra o plantación y la 2ª inmediatamente después de la siembra o transplante a razón de 2,5 Kg/Ha. y aplicación.

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Calabacín, Fresaes, Lechuga, Melón, Olivo, Pimiento, Tomate	NP

Condiciones generales de uso:

Aplicar mediante el agua de riego, en pulverización o en mezcla con el sustrato según los casos.

Excepciones: --**Clase de usuario:**

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación: --

**Clasificaciones y Etiquetado:**

Clase y categoría de peligro (Humana)	Nocivo
Pictograma	Xn
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	R42/43 - Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel
Consejos de Prudencia	S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S22 - No respirar los polvos S36/37 - Utilizar ropa de protección y guantes adecuados S42 - Durante la fumigación/pulverización, utilizar máscara respiratoria adecuada (denominación(es) adecuada (as) a especificar por el fabricante) S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	
Consejos Prudencia	

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales: --

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Otras indicaciones reglamentarias:



Nº REGISTRO: 25234

BIOTEN

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --