

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 25.393
Nombre comercial: GAZEL PLUS SG

Titular:

NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH
 Berliner Allee - 42
 D-40212
 DÜSSELDORF
 ALEMANIA

Fabricante:

NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH
 Berliner Allee - 42
 D-40212
 DÜSSELDORF
 ALEMANIA

Fecha de inscripción: 28/07/2010

Fecha de caducidad: 30/04/2018

Tipo de envase:

Bolsas de plástico de 10, 50, 60, 100, 250, 300, 350, 500 y 550 kg presentadas en cajas de cartón.

Composición: ACETAMIPRID 20% [SG] P/P

Tipo de preparado: GRANULOS SOLUBLES EN AGUA [SG]

Tipo de función: Insecticida

Ámbitos de utilización: Cultivos, Viveros, Plantaciones Agrícolas

Usos autorizados:

<u>Cultivo/Especie:</u>	<u>Plaga/Efecto:</u>	<u>Dosis:</u>	<u>P.S.</u>
(1) Alfalfa	PULGONES	75-100 g/ha	14
(2) Algodonero	MOSCA BLANCA	250-300 g/ha	14
(3) Algodonero	PULGONES	200-250 g/ha	14
(4) Arbustos ornamentales	MOSCA BLANCA	350-400 g/ha	NP
(5) Arbustos ornamentales	PULGONES	250 g/ha	NP
(6) Berenjena	MOSCA BLANCA	350-400 g/ha	7
(7) Berenjena	PULGONES	250 g/ha	7
(8) Cítricos	PHYLLOCNISTIS	25 g/Hl	14
(9) Cítricos	PULGONES	25 g/Hl	14
(10) Frutales de hueso	MINADORES	25 g/Hl	14
(11) Frutales de hueso	PULGONES	25 g/Hl	14
(12) Frutales de pepita	MINADORES	25 g/Hl	14
(13) Frutales de pepita	PULGONES	25 g/Hl	14
(14) Lechuga	PULGONES	250 g/ha	7
(15) Melón	MOSCA BLANCA	200-250 g/ha	7
(16) Melón	PULGONES	125-150 g/ha	7
(17) Ornamentales herbáceas	MOSCA BLANCA	350-400 g/ha	NP
(18) Ornamentales herbáceas	PULGONES	250 g/ha	NP

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 25.393
Nombre comercial: GAZEL PLUS SG

(19) Patata	ESCARABAJO	125 g/ha	7
(20) Patata	PULGONES	200 g/ha	7
(21) Pepino	MOSCA BLANCA	350-400 g/ha	3
(22) Pepino	PULGONES	250 g/ha	3
(23) Pimiento	MOSCA BLANCA	350-400 g/ha	7
(24) Pimiento	PULGONES	250 g/ha	7
(25) Tabaco	MOSCA BLANCA	250-300 g/ha	14
(26) Tabaco	PULGONES	250-300 g/ha	14
(27) Tomate	MOSCA BLANCA	350-400 g/ha	7
(28) Tomate	PULGONES	250 g/ha	7
(29) Viveros de cítricos	PHYLLOCNISTIS	25 g/Hl	NP
(30) Viveros de cítricos	PULGONES	25 g/Hl	NP
(31) Platanera	COCHINILLAS	500 g/ha	21
(32) Platanera	MOSCA BLANCA	500 g/ha	21

P.S.: Plazo de seguridad (días)

Usos protegidos hasta fecha: (31) , (32)

Condicionamientos fitoterapéuticos:

Generales : Aplicar en pulverización foliar al inicio de la infestación, realizando como máximo 2 tratamientos excepto en cítricos que se efectuara sólo uno. En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para la correcta utilización del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su utilización por fitotoxicidad en variedades sensibles del propio cultivo o en los adyacentes.

Específicos (1) Tratar con un volumen de caldo de 500 l/Ha..
 (2), (3) Tratar con un volumen de caldo de 500-800 l/Ha..
 (4), (17) Tratar con un volumen de caldo de 1.000 l/Ha.. Debido al gran nº de tipos y variedades de plantas ornamentales se recomienda, antes de la aplicación en el cultivo realizar una prueba en un área pequeña. Acción secundaria contra trips.
 (5), (18) Tratar con un volumen de caldo de 1.000 l/Ha.. Debido al gran nº de tipos y variedades de plantas ornamentales se recomienda, antes de la aplicación en el cultivo realizar una prueba en un área pequeña.
 (6), (7), (23), (24), (27), (28) P.S.: 3 días en invernadero. Volumen de caldo al aire libre: 500-1.000 l/Ha., en invernadero 1.000-1.700 l/Ha..
 (8), (9) Tratar al comienzo de la primavera, durante el período de crecimiento de los brotes hasta la caída de los pétalos usando un volumen de caldo de 2.000 l/Ha..
 (10), (11) Tratar con un volumen de caldo máximo de 1.000-1.500 l/Ha., excepto ciruelo con 1.000 l/Ha..
 (12), (13) Tratar con un volumen de caldo máximo de 1.000-1.500 l/Ha..
 (14) Tratar con un volumen de caldo máximo de 500-1.000 l/Ha..
 (15), (16) Sólo en cultivo al aire libre. Tratar con un volumen de caldo máximo de 500-600 l/Ha..
 (19), (20) Tratar con un volumen de caldo de 400 l/Ha..
 (21), (22) Sólo en cultivo de invernadero. Tratar con un volumen de caldo de 1.000-1.700 l/Ha..
 (25), (26) Tratar con un volumen de caldo de 500-1.000 l/Ha..
 (29) Aplicar principalmente en las nuevas brotaciones durante el verano, con un volumen de caldo de 600-1000 l/Ha..
 (30) Tratar con un volumen de caldo máximo de 600-1000 l/Ha..
 (31), (32) Máximo 2 aplicaciones. Uso en invernadero, aplicar dosis de 320 g/ha

Condicionamientos preventivos de riesgos:

Mitigación de riesgos medioambientales:

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 25.393
Nombre comercial: GAZEL PLUS SG

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 metros hasta las masas de agua superficial.

En invernaderos donde se haya aplicado este producto, Bombus (para la polinización de flores) y/o ácaros deben ser liberados sólo después del secado de las hojas.

Los parásitos himenópteros deben ser liberados al menos 2 semanas después de la aplicación.

El predador Orius debe ser liberado al menos 7 semanas después de la aplicación.

Dejar sin tratar un 5% de la zona de cítricos para la protección del insecto beneficioso *Cales noaki*.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Condiciones de uso al aire libre en platanera:

En mezcla/carga y en aplicación utilizar guantes. Además en aplicación manual utilizar mono tipo 6: que protege contra salpicaduras líquidas conforme a EN 13034: 2005 + A1:2009.

No entrar al cultivo hasta que el residuo esté seco.

En el caso de que la duración de las tareas del trabajador en la reentrada al cultivo tratado supere las 2 horas, son necesarias medidas adicionales de mitigación de la exposición. Se proponen dos opciones: Reducir el nº de aplicaciones a una sola aplicación ó dos aplicaciones con un intervalo de 14 días y establecer un plazo de reentrada de 19 días.

Condiciones de uso en invernadero en platanera:

En mezcla/carga y en aplicación utilizar guantes. Además en aplicación utilizar mono tipo 4: que protege contra penetración de productos líquidos conforme a EN 14605:2005+A1:2009.

No entrar al cultivo hasta que el residuo esté seco.

En el caso de que la duración de las tareas del trabajador en la reentrada al cultivo tratado supere las 2 horas, son necesarias medidas adicionales de mitigación de la exposición. Se proponen dos opciones: Reducir el nº de aplicaciones a una sola aplicación ó dos aplicaciones con un intervalo de 14 días y establecer un plazo de reentrada de 20 días

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

SPo 5: Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

Restricciones por clases de usuarios:

Uso profesional.

Envases:

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

Clasificación :	Atención, Toxicidad aguda (oral). Categoría 4., Acuático agudo 1
Símbolos y pictogramas:	--
Frases de riesgo:	H302, H410, EUH 401
Consejos de prudencia:	P261, P273, P280, P391, P501
Otras indicaciones reglamentaria	La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto. SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). En la etiqueta deberá indicarse que "contiene alquil bencen sulfonato sódico C 10-13 (CAS 68411-30-3)".