

# Cumdeo Rouge



## Ampelografía

### Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación débil Densidad media-alta

### Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas-rojo en la cara dorsal Verde con rayas rojas-rojo en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Rojo en la cara dorsal Verde con rayas rojas-rojo en la cara ventral


<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula-baja en nudos Nula-baja en entrenudos
--------------------------------	---

### Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Pigmentación nula-débil
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Baja-media entre nervios Baja-media sobre nervios

### Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio-grande
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco-siete
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio-poco abierto y ligeramente superpuesto
<i>Hinchazón del haz</i>	Débil-media
<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial con lóbulos cerrados-muy superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Baja-media
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Laxa-media
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Alta
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo igual con densidad muy baja-baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos, de longitud media y con relación longitud-anchura pequeña-media



# Cumdeo Rouge



## **Racimo:**

<i>Tamaño</i>	Pequeño-medio
<i>Compacidad</i>	Medio-compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto-muy corto

## **Baya:**

<i>Tamaño</i>	Pequeña-mediana
<i>Uniformidad tamaño</i>	Regular
<i>Color Epidermis</i>	Azul-negra
<i>Forma de perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil-relativamente fácil
<i>Grosor piel</i>	Media
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Presentes

## **Sarmiento:**

<i>Color</i>	Marrón oscuro/ Amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

## **Fenología:**

Época de desborre: media

Época de maduración: muy temprana-tremprana

## **Aptitudes agronómicas:**

- Rendimiento muy bajo.

## **Potencial enológico:**

- Vinos alcohólicos con una acidez del mosto muy alta.