

Gold



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierto
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula o muy débil Densidad débil

Pámpano:



<i>Color entrenudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color entrenudo</i>	Verde en cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Débil
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Media-alta entre nervios Nula o muy débil sobre nervios

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio-poco abierto
<i>Hinchazón del haz</i>	Débil
<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial-superficial con lóbulos cerrados
<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy débil entre nervios del envés
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy débil sobre nervios del envés
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud medios con relación longitud-anchura media-grande



Gold



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Compacidad</i>	Suelto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde-amarilla
<i>Forma de perfil</i>	Elíptica ancha
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Ligeramente dura
<i>Suculencia pulpa</i>	Ligeramente jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Moscatel
<i>Formación pepitas</i>	Bien formada

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón oscuro
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

Fenología:

Época de desborre: temprana

Época de maduración: muy temprana

Aptitudes agronómicas:

- Se adapta bien a la conducción en parral con poda mixta.
- Elevada fertilidad, por lo que es aconsejable el aclareo. Vigor alto.
- Resistente al transporte y a la conservación frigorífica.
- Apta para el consumo en fresco por sus buenas características organolépticas, como sabor a moscatel y pulpa crujiente.