

# Mollar Cano



## Ampelografía

### Sumidad:

*Apertura extremidad* Completamente abierta

*Pelos postrados de la extremidad* Pigmentación débil  
Densidad alta

### Pámpano:

*Color entrenudo* Verde con rayas rojas en la cara dorsal  
Verde con rayas rojas en la cara ventral

*Color nudo* Verde en la cara dorsal  
Verde-verde con rayas rojas en la cara ventral

*Densidad pelos tumbados* Baja en nudos

### Hoja joven:

*Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales* Nula o muy débil-débil

*Densidad pelos tumbados* Muy densa entre nervios  
Media sobre nervios

### Hoja adulta:

*Tamaño del limbo* Medio

*Forma del limbo* Pentagonal

*Número de lóbulos* Cinco

*Disposición lóbulos del seno peciolar* Poco abierto-ligeramente superpuestos

*Hinchazón del haz* Media

*Perfil en sección transversal* Bordes hacia el envés

*Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores* Profundidad superficial con lóbulos abiertos


*Pigmentación del haz* Ausente o muy débil

*Densidad pelos tumbados entre nervios principales* Media

*Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales* Baja

*Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo* Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

*Forma y longitud de dientes* Dientes con ambos lados convexos de longitud cortos y con relación longitud-anchura muy pequeña



# Mollar Cano



## Racimo:

Tamaño	Grande
Compacidad	Suelto
Longitud pedúnculo	Corto

## Baya:

Tamaño	Media
Uniformidad tamaño	No uniforme
Color Epidermis	Rojo-violeta oscura
Forma de perfil	Circular-elíptica ancha
Separación pedicelo	Relativamente fácil
Grosor piel	Gruesa
Pigmentación pulpa	Ausente o muy débil
Consistencia pulpa	Blanda-ligeramente dura
Suculencia pulpa	Jugosa muy jugosa
Sabores particulares	Herbáceo
Formación pepitas	Bien formadas

## Sarmiento:

Color	Marrón oscuro
Relieve superficie	Estriada

## Fenología:

Época de desborre: media  
Época de maduración: media

## Aptitudes agronómicas:

- Vigor medio bajo, fertilidad media.
- Racimo de compacidad media.  
Rendimiento medio.
- Sensible a los cambios bruscos de temperatura.

## Potencial enológico:

- Mosto de alto grado alcohólico y acidez baja.

