

Moscatel de Grano Menudo

Sinonimias: Moscatel Morisco.



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad

Abierta

Pelos postrados de la extremidad

Pigmentación media
Densidad débil

Pámpano:

Color entrenudo

Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Color nudo

Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Densidad pelos tumbados

Nula o muy débil en el nudo
Nula o muy débil en el entrenudo

Hoja joven:

Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales

Fuerte

Densidad pelos tumbados

Débil-media

Hoja adulta:

Tamaño del limbo

Media

Forma del limbo

Pentagonal

Número de lóbulos

Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar

Poco abierto
en V

Hinchazón del haz

Entre débil y media

Perfil en sección transversal

En V

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores

Profundidad superficial con lóbulos superpuestos

Pigmentación del haz

Nula o muy débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales

Nula o muy baja

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales


Nula-baja

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo


Peciolo corto con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes

Dientes con ambos lados rectilíneos, de longitud media y con relación longitud-anchura mediana



Moscatel de Grano Menudo



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Pequeño-mediano
<i>Compacidad</i>	Compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Muy corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Pequeña-mediana
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde-amarilla
<i>Forma de perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Delgada
<i>Pigmentación pulpa</i>	No coloreada
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Moscatel
<i>Formación pepitas</i>	Presentes

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón-amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Estriado

Fenología:

Época de desborre: entre temprana y media

Época de maduración: muy temprana

Aptitudes agronómicas:

- Planta poco vigorosa, porte entre semierguido y erguido.
- Fertilidad media. Poco productiva, racimos pequeños.
- Medianamente resistente a sequía, prefiere suelos pobres y que retrasen la maduración. Precisa podas largas.

Potencial enológico:

- Vino muy alcohólico de color amarillo dorado, muy aromático, aromas florales propios de la variedad que recuerdan a miel, cierto retrogusto amargo, acidez alta, vino muy amplio y sabroso en boca.
- Antiguamente se empleaba para la elaboración de vinos dulces denominados "supurados". Actualmente se emplea para elaborar vinos jóvenes o fermentados en barrica con cierto grado de azúcar.

