

Syrah



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula o muy débil Densidad alta-muy alta

Pámpano:


<i>Color entrenudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Baja en nudos Baja en entrenudos

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Nula o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Densa entre nudos Densa sobre nervios

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio-grande
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio abierto
<i>Hinchazón del haz</i>	Media
<i>Perfil en sección transversal</i>	Bordes hacia el envés-alabeado
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial-media con lóbulos ligeramente superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Media entre nervios
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Baja sobre nervios
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes con ambos lados convexos de longitud media y con relación longitud-anchura pequeña-mediana



Syrah



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Medio
<i>Compacidad</i>	Medio
<i>Longitud pedúnculo</i>	Medio

Baya:

<i>Tamaño</i>	Pequeña-media
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Azul negra
<i>Forma de perfil</i>	Circular-elíptica corta
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Media-gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Ligeramente dura
<i>Suculencia pulpa</i>	Apenas jugosa-ligeramente jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Bien formada

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón amarillento-marrón oscuro
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

Fenología:

Época de desborre: media

Época de maduración: temprana

Aptitudes agronómicas:

- Emite pámpanos largos y frágiles, sensible al viento, por lo que debe ser empalizada y podada corta
- Muy sensible a clorosis y mal adaptada a suelos calizos.
- Periodo óptimo de recolección relativamente corto. Evitar un exceso de rendimiento y sobremaduración.
- Bastante sensible a ácaros y a botrytis, sobre todo al final de la maduración. Resistente al mildiu, al oídio y a la excoriosis.

Potencial enológico:

- Vinos tintos de buen grado alcohólico aptos para un envejecimiento de gran calidad, de color intenso (azulado), muy aromáticos, finos y complejos con aromas que recuerdan la violeta, el cuero, el tabaco y el regaliz; tánicos, con estructura y relativamente poco ácidos.
- Es posible elaborar también vinos rosados muy afrutados e interesantes.

