

Tempranillo

Sinonimias: Cencibel. Tinto fino. Tinto de Toro. Tinto del País. Ull de Llebre



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Completamente abierta

Pelos postrados de la extremidad Pigmentación media
Densidad media-alta

Pámpano:

Color entrenudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Color nudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Densidad pelos tumbados Media en nudos
Baja en entrenudos

Hoja joven:

Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales Débil

Densidad pelos tumbados Densa entre nervios
Media sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Grande

Forma del limbo Pentagonal

Número de lóbulos Cinco-siete

Disposición lóbulos del seno peciolar Ligeramente-medio superpuestos

Hinchazón del haz Media

Perfil en sección transversal Alabeado

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad media con lóbulos ligeramente superpuestos


Pigmentación del haz Ausente o muy débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Nula o muy baja


Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Media-alta

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Peciolo más corto-ligeramente más corto que el nervio central con densidad baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes rectilíneos-convexos de longitud largos y con relación longitud-anchura grande



Tempranillo



Racimo:

Tamaño	Mediano-grande
Compacidad	Compacto
Longitud pedúnculo	Corto-medio

Baya:

Tamaño	Pequeña
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Negra-azul
Forma de perfil	Circular
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Gruesa
Pigmentación pulpa	Ausente o muy débil
Consistencia pulpa	Blanda
Suculencia pulpa	Muy jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Bien formadas

Sarmiento:

Color	Amarillo
Relieve superficie	Lisa-estriada

Fenología:

Época de desborre: temprana

Época de maduración: temprana

Aptitudes agronómicas:

- Variedad de ciclo corto. Porte erguido. Sensible al viento. Fértil, poda de pulgares.
- Potencial productivo medio-alto en función del terreno. Sensible a sequía extrema.
- Sensible al oídio y medianamente sensible a excoriosis.

Potencial enológico:

- En función de los rendimientos, con producciones limitadas de óptimos productos, poca acidez.
- Indicada para elaboración de vinos jóvenes con maceración carbónica.
- Admite crianza en bodega de roble, con buenos resultados. Vendimiada adecuadamente permite la elaboración de vinos de excelente calidad.

