

Alfonso Lavallée



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Completamente abierta

Pelos postrados de la extremidad Pigmentación débil
Densidad media-alta

Pámpano:

Color entrenudo Verde en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Color nudo Verde en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Densidad pelos tumbados Nula o muy baja en los nudos
Nula o muy baja en los entrenudos

Hoja joven:

Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales Débil

Densidad pelos tumbados Media entre nervios
Baja sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Muy grande

Forma del limbo Pentagonal

Número de lóbulos Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar Poco abierto

Hinchazón del haz Débil

Perfil en sección transversal Alabeado

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad superficial con lóbulos ligeramente superpuestos

Pigmentación del haz Débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Baja

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Media

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes a ambos lados convexos de longitud medios y con relación longitud-anchura mediana



Alfonso Lavallée



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Compacidad</i>	Suelto-medio
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Muy grande
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Negra-azul
<i>Forma de perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Media-gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda-Ligeramente dura
<i>Suculencia pulpa</i>	Ligeramente jugosa-muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Bien formada

Sarmiento:

<i>Color</i>	Amarillo-marrón amarillento
<i>Relieve Superficie</i>	Liso

Fenología:

Época de desborre: media
Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:

- Vigor entre fuerte y muy fuerte.
- Tendencia al millerandage y corrimiento, poda aconsejada corta.
- Rendimiento muy alto. Fertilidad alta.
- Poco sensible a botrytis, resiste al mildiu, muy sensible a excoriosis y a veces al rajado.

Potencial enológico:

- Como uva de mesa, sin mucho gusto, potencial gustativo medio.
- Poco perfumada, sabor ligeramente herbáceo de la piel, hollejo espeso.
- Bella presentación, coloración homogénea, aguanta bien el transporte.